

ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN PARA TRABAJADORES DE LA AGROINDUSTRIA

VACUNAS	INDICACIONES	DOSIS/ESQUEMAS VÍA ADMINISTRACIÓN	COMENTARIOS
Hepatitis B	Personas en zonas de riesgo y presencia de virus Delta.	3 dosis/20 mcg. 0, 1 6 meses o 0, 1, 2 (+12 meses). I.M. Región deltoidea.	No se recomienda medición de títulos ni refuerzos. Niveles de protección iguales o superiores a 10 UI/L.
Influenza	Todos los trabajadores	1 dosis anualmente. I.M. Región deltoidea.	Reduce el ausentismo laboral.
Tétanos difteria (t-d) o *Tdap (tétanos, difteria, pertussis).	Mantener los esquemas para la población general.	Refuerzo C/10 años. I.M. Región deltoidea.	Si se tiene previamente el esquema completo.
Hepatitis A	Trabajadores sin antecedentes de la enfermedad o vacunación previa.	2 dosis 0, 6 a 12 meses. I.M. Región deltoidea.	Inmunidad previa por IgG anti HA. No es necesaria de rutina la prueba IgG.
Fiebre tifoidea	Trabajadores en áreas endémicas.	1 dosis. IM. Región deltoidea.	Revacunación cada 3 años.
Fiebre amarilla	Trabajadores en áreas endémicas. Aplicación durante epidemias.	1 dosis. S.C.	Revacunación cada 10 años. Contraindicada en personas con anafilaxia al huevo, embarazadas o inmunocomprometidos. Precaución en mayores de 60 años.
Rabia	Trabajadores en áreas endémicas.	Pre-exposición: 3 dosis días 0, 7 y 28. Primer refuerzo al año. Refuerzos posteriores cada 3 años. Post-exposición: 5 dosis a los días 0, 3, 7, 14, 28. IM. Región deltoidea.	De acuerdo con la severidad de la mordedura agregar en los días 0 y 20 UI/Kg de peso de inmunoglobulina antirrábica de origen humano o 40 UI/ Kg de suero antirrábico purificado de origen equino.
Meningococo B+A A+C	En regiones endémicas o con brotes por meningococo.	Vacuna B+C: 2 dosis /6-8 semanas. Vacuna A+C: 1 dosis IM. Región deltoidea. Vacuna A+C+Y+W135 conjugadas. Disponible desde 2do semestre 2010 en Colombia. 1 dosis IM.	Regiones endémicas. Vacunación de acuerdo con el subgrupo de meningococo. Necesaria en control de brotes.A+C+Y+W135 conjugadas