

**ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN PARA TRABAJADORES MANIPULADORES DE ALIMENTOS**

<b>VACUNAS</b>	<b>INDICACIONES</b>	<b>DOSIS/ESQUEMAS VÍA ADMINISTRACIÓN</b>	<b>COMENTARIOS</b>
Hepatitis A	Personal no inmune	2 dosis 0, 6-12 meses. I.M. Región deltoidea	Inmunidad previa por IgG anti HA. No es necesaria de rutina la prueba serológica de IgG.
F. tifoidea	Especialmente en áreas de riesgo.	1 dosis. I.M.	Revacunación cada 3 años.
Influenza	Los manipuladores en cocina. En empresas y procesadoras de aves durante brotes de influenza aviar.	1 dosis anual. I.M. Región deltoidea.	Reduce el ausentismo laboral. Vacunación durante el primer semestre en Colombia.
Tétanos Difteria Pertussis(Tdap)*	Refuerzo para tétanos, difteria.	1 dosis cada 10 años. I.M. Región deltoidea.	Si se tiene previamente el esquema completo.
F. amarilla	Trabajadores en áreas endémicas o en visita a esas áreas. Aplicación durante epidemias.	1 dosis. Vía subcutánea.	Revacunación cada 10 años. Contraindicada en personas anafilaxia a huevo, embarazadas e inmunocomprometidos. Precaución en mayores de 60 años.
Leptospirosis	Trabajadores expuestos a orina de animales infectados o roedores	2 dosis con 6 semanas de intervalo vía subcutánea	Población entre 20 y 60 años. Excluye a embarazadas.