

ESQUEMA RECOMENDADO DE VACUNACIÓN PARA TRABAJADORES DE LA SALUD (TS)

VACUNAS	INDICACIONES	DOSIS/ESQUEMAS VÍA ADMINISTRACIÓN	COMENTARIOS
Hepatitis B	Todos los TS. Requisito para ingresar a las facultades de áreas de salud y para ingreso laboral	3 dosis/20 mcgr 0.1, 6 meses 0, 1, 2, (+12 meses). IM. Región deltoidea.	Alta respuesta. Se sugiere control de títulos de anti-cuerpos luego de la vacunación. Protección: títulos iguales o superiores a 10 UI/L.
Influenza	Todos los TS, especialmente los que están en contacto con pacientes de alto riesgo.	Una dosis anual. IM. Región deltoidea.	Reduce tanto la transmisión a los pacientes como el ausentismo laboral. Vacunación idealmente en primer semestre.
Triple viral (rubeola, sarampión y paperas)	Individuos no vacunados. Insistir en rubeola en mujeres susceptibles. Mayor riesgo: personal en áreas y hospitales pediátricos y de atención materno-infantil.	Dos dosis con un mes de intervalo. S.C.	Los TS no inmunes tienen riesgo de adquirirla o transmitirla a mujeres en embarazo. No aplicar durante el embarazo.
Varicela. Virus varicela zóster (V Vz)	Personal de salud no inmunizado con riesgo de exposición al V VZ. Control de brotes a partir de tres días de detección del caso índice.	1-2 dosis dependiendo del riesgo de exposición. SC. En post exposición entre 3 y 5 días posterior al contacto 1 dosis.	Frecuentes brotes en estudiantes del área de la salud. Riesgo para mujeres no inmunes en embarazo, por infección fetal. No durante embarazo. Esperar 30 días post vacunación para embarazo.
Tétanos, difteria, Pertussis (tosferina) (Tdap)	Mantener los esquemas para la población general, por re-emergencia de pertussis.	1 dosis cada 10 años. I.M. Región deltoidea.	Si se tiene previamente el esquema completo. Uso ideal > 2 años posterior a Td.
Hepatitis A	Personal de salud no inmune, mandatario para el personal de laboratorio.	2 dosis 0, 6-12 meses. I.M. Región deltoidea.	Inmunidad previa por IgG anti HA. No es necesaria la rutina de prueba de IgG.
Fiebre amarilla	TS en áreas endémicas o con viajes a estas áreas.	1 dosis S.C.	Re vacunación cada 10 años. No en embarazo ni inmunocomprometidos. Anafilaxia al huevo.
Fiebre tifoidea	TS en áreas endémicas y en trabajadores de laboratorio.	1 dosis. I.M. Región deltoidea.	Re vacunación cada 3 años.
Rabia	Riesgo profesional. Viajeros.	Pre-exposición: 3 dosis días 0, 7 y 28. Primer refuerzo al año, refuerzos posteriores cada 3 años. Post exposición: 5 dosis los días 0, 3, 7, 14 y 28. I.M. Región deltoidea.	Post exposición: de acuerdo con la severidad de la mordedura agregar en el día 0, 20 UI/kg de peso de inmuno-globulina antirrábica de origen humano o 40 UL/kg de suero antirrábico purificado de origen equino