

ESQUEMA DE VACUNACIÓN NIÑOS 0 a 10 AÑOS

EDAD	DOSIS	NOMBRE GENÉRICO	ENFERMEDADES QUE PREVIENE	OBSERVACIONES
2 MESES	Primera	DTPa+Hepatitis B+Polio+Hib	Difteria, tétanos, tosferina Acelular, Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae type B, Poliomieltitis, Hepatitis B	
	Primera	Rotavirus	Diarrea por rotavirus	
	Primera	Neumococo	Neumonía, otitis, meningitis y bacteremia	
	Primera	Meningococo A,C,Y, W135	Enfermedad meningocócica invasiva causada por Neisseria meningitidis de los serogrupos A, C, W 135 Y.	
3 MESES	Primera	Meningococo A, C, Y, W135	Enfermedad meningocócica invasiva causada por Neisseria meningitidis de los serogrupos A, C, W 135 Y.	No se aplica si ya inició esquema de vacunación con otra vacuna meningococcica
4 MESES	Segunda	DTPa+Hepatitis B+Polio+Hib	Difteria, tétanos, tosferina Acelular, Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae type B, Poliomieltitis, Hepatitis B	
	Segunda	Rotavirus	Diarrea por rotavirus	
	Segunda	Neumococo	Neumonía, otitis, meningitis y bacteremia	
	Segunda	Meningococo A,C,Y, W135	Enfermedad meningocócica invasiva causada por Neisseria meningitidis de los serogrupos A, C, W 135 Y.	
5 MESES	Segunda	Meningococo A, C, Y, W135	Enfermedad meningocócica invasiva causada por Neisseria meningitidis de los serogrupos A, C, W 135 Y.	No se aplica si ya inició esquema de vacunación con otra vacuna meningococcica
6 MESES	Tercera	DTPa+Hepatitis B+Polio+Hib	Difteria, tétanos, tosferina Acelular, Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae type B, Poliomieltitis, Hepatitis B	
	Tercera	Rotavirus	Diarrea por rotavirus	
	Tercera	Neumococo	Neumonía, otitis, meningitis y bacteremia	
	Primera	Influenza	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza	
7 MESES	Tercera	Influenza	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza	
9 MESES	Primera	Meningococo A, C, Y, W135	Enfermedad meningocócica invasiva causada por Neisseria meningitidis de los serogrupos A, C, W 135 Y.	No se aplica si ya inició esquema de vacunación con otra vacuna meningococcica
12 MESES	Primera	Sarampion+Paperas+ Rubeola	Sarampión, rubeola y paperas	
	Primera	Varicela	Varicela	
	Primera	Hepatitis A	Hepatitis A	
	Refuerzo	Influenza	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza	
13 MESES	Refuerzo	Meningococo A,C,Y, W135	Enfermedad meningocócica invasiva causada por Neisseria meningitidis de los serogrupos A, C, W 135 Y.	
15 MESES	Refuerzo	Neumococo	Neumonía, otitis, meningitis y bacteremia	
18 MESES	Primer refuerzo	Pentavalente Acelular-DTPa+Polio+Hib	Difteria, tétanos, tosferina Acelular, Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae type B, Poliomieltitis	
	Segunda	Hepatitis A	Hepatitis A	
	Única	Fiebre Amarilla	Fiebre Amarilla	
5 AÑOS	Segundo refuerzo	DPT mas polio acelular	Difteria, tétanos, tosferina Acelular, Poliomieltitis	
	Refuerzo	Sarampion+Paperas+ Rubeola	Sarampión, rubeola y paperas	
	Refuerzo	Varicela	Varicela	
9 AÑOS	Primera: fecha elegida	Virus Papiloma Humano contra 4 serotipos o contra 9 serotipos	Gardasil 9 es una vacuna que está indicada para niños/as y adolescentes a partir de los 9 años de edad y adultos. Se administra para proteger frente a enfermedades causadas por los tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58 del Virus del Papiloma Humano (VPH). Estas enfermedades incluyen lesiones precancerosas y cánceres de los genitales femeninos (cuello de útero, vulva y vagina); lesiones precancerosas y cánceres de ano y verrugas genitales en hombres y mujeres	
	Segunda: 2 meses después de la primera	Virus Papiloma Humano contra 4 serotipos o contra 9 serotipos		
	Tercera: 4 meses después de la segunda	Virus Papiloma Humano contra 4 serotipos o contra 9 serotipos		
10 AÑOS	Refuerzo	DPT Acelular	Difteria, tétanos, tosferina Acelular	